














Información nueva sobre los efectos secundarios de los medicamentos

Medicamento	Se usa para	Posibles efectos secundarios
Narcóticos <input type="checkbox"/> Hydrocodone/Acetaminophen (Norco, Lortab) <input type="checkbox"/> Hydromorphone (Dilaudid) <input type="checkbox"/> Morphine <input type="checkbox"/> Oxycodone/Acetaminophen (Percocet) <input type="checkbox"/> Oxycodone <input type="checkbox"/> _____	Dolor 	Aturdimiento Somnolencia (sensación de cansancio) Picazón Estreñimiento Náuseas/malestar estomacal Dificultad para respirar
Antieméticos <input type="checkbox"/> Metoclopramide (Reglan) <input type="checkbox"/> Ondansetron (Zofran) <input type="checkbox"/> Promethazine (Phenergan) <input type="checkbox"/> _____	Náuseas o vómitos 	Debilidad Mareos Somnolencia Estreñimiento Inquietud
Reductores de ácido <input type="checkbox"/> Pantoprazole (Protonix) <input type="checkbox"/> Famotidine (Pepcid) <input type="checkbox"/> _____	Acidez o reflujo 	Diarrea Dolor abdominal Estreñimiento (en el caso de Pepcid)
Estatinas <input type="checkbox"/> Atorvastatin (Lipitor) <input type="checkbox"/> Pravastatin (Pravachol) <input type="checkbox"/> Simvastatin (Zocor) <input type="checkbox"/> _____	Reducir el colesterol 	Náuseas Diarrea Dolor muscular o debilidad En tal caso, llame a su proveedor de atención médica
Antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) <input type="checkbox"/> Diclofenac (Voltaren) <input type="checkbox"/> Ibuprofen (Advil, Motrin) <input type="checkbox"/> Ketorolac (Toradol) <input type="checkbox"/> Naproxen (Aleve) <input type="checkbox"/> _____	Ayudar a reducir el dolor o la inflamación 	Riesgo de sangrado Síntomas gastrointestinales
Antiplaquetarios <input type="checkbox"/> Aspirin (Ecotrin, Bayer) <input type="checkbox"/> Clopidogrel (Plavix) <input type="checkbox"/> Prasugrel (Effient) <input type="checkbox"/> Ticagrelor (Brilinta) <input type="checkbox"/> _____	Evitar coágulos de sangre 	Riesgo de sangrado Malestar gastrointestinal Dolor de cabeza Dificultad para respirar (Brilinta*) * No deje de tomarlo sin informar a su médico.

Medicamento: Nombre genérico (Marca)	Se usa para	Posibles efectos secundarios
Anticoagulantes <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Warfarin (Coumadin) <input type="checkbox"/> Enoxaparin (Lovenox) <input type="checkbox"/> Heparin <input type="checkbox"/> Apixaban (Eliquis) <input type="checkbox"/> Dabigatran (Pradaxa) <input type="checkbox"/> Rivaroxaban (Xarelto) <input type="checkbox"/> _____ 	Evitar o tratar coágulos de sangre 	Riesgo de sangrado Hematomas Dolor abdominal (en el caso de warfarin) Fiebre (en el caso de enoxaparin) Náuseas (en el caso de enoxaparin)
Antiarrítmicos <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amiodarone (Cordarone, Pacerone) <input type="checkbox"/> Digoxin (Lanoxin) <input type="checkbox"/> Flecainide (Tambocor) <input type="checkbox"/> Propafenone (Rythmol) <input type="checkbox"/> Sotalol (Betapace) <input type="checkbox"/> _____ 	Ritmo cardíaco anormal e insuficiencia cardíaca 	Mareos Dolor de cabeza Náuseas/vómitos Dificultad para respirar Cansancio Cambios en la presión arterial o la frecuencia cardíaca
Bloqueadores de los canales de calcio <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diltiazem (Cardizem, Tiazac, Dilacor XR) <input type="checkbox"/> Verapamil (Calan, Verelan) <input type="checkbox"/> Amlodipine <input type="checkbox"/> _____ 	Bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca 	Mareos Dolor de cabeza Estreñimiento (en el caso de verapamil) Cambios en la presión arterial o la frecuencia cardíaca
Betabloqueadores <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atenolol (Tenormin) <input type="checkbox"/> Carvedilol (Coreg) <input type="checkbox"/> Metoprolol (Toprol XL, Lopressor) <input type="checkbox"/> _____ 	Insuficiencia cardíaca Bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca 	Mareos Somnolencia Fatiga Disminución de la frecuencia cardíaca
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE) o bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARB) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lisinopril (Zestril, Prinivil) <input type="checkbox"/> Valsartan (Diovan) <input type="checkbox"/> Entresto (CHF) <input type="checkbox"/> _____ 	Bajar la presión arterial y evitar la insuficiencia cardíaca 	Mareos Tos seca Dolor de cabeza
Corticoides <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Methylprednisolone (Solumedrol) <input type="checkbox"/> Dexamethasone (Decadron) <input type="checkbox"/> Prednisone (Deltasone) <input type="checkbox"/> _____ 	Reducir la inflamación 	Malestar gastrointestinal Aumento del apetito Aumento del nivel de azúcar en la sangre Dificultad para dormir Aumento de la frecuencia cardíaca
Antibióticos <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amoxicillin (Amoxil) <input type="checkbox"/> Cefazolin (Ancef, Kefzol) <input type="checkbox"/> Clindamycin <input type="checkbox"/> Levofloxacin <input type="checkbox"/> Piperacillin/Tazobactam (Zosyn) <input type="checkbox"/> Vancomycin (Vancocin) <input type="checkbox"/> _____ 	Tratar infecciones bacterianas 	Malestar gastrointestinal Sarpullido Picazón Diarrea